



3. Vervolg vragenlijst SOA-triage (in te vullen door patiënt samen met assistente/huisarts)

Naam patiënt: _____
Geboortedatum: _____

9. Wat is de reden waarom u een SOA-onderzoek aanvraagt? (meerdere antwoorden mogelijk):

Antwoord gegeven bij vraag 1:

- Ik ben bezorgd een SOA te hebben, omdat _____
- Ik ben gewaarschuwd omdat mijn sekspartner een SOA heeft, namelijk _____
- Mijn zorgverlener denkt dat ik een SOA kan hebben, omdat _____

Aanvullend:

- Ik heb klachten, namelijk (vul cijfers in van de klachten hieronder): _____
- Mijn partner heeft klachten, namelijk (vul cijfers in van de klachten hieronder): _____
- Ik kom voor een periodieke controle voor _____
- Ik erken dat ik risicogedrag laat zien, namelijk _____
- Ik merk dat mijn partner risicogedrag vertoont, namelijk _____
- Ik een nieuwe relatie heb / mijn relatie heb beëindigd.
- Mij seksueel geweld is aangedaan. (Datum/periode: _____)
- Ik ben onzeker, angstig en ongerust, omdat _____

Vrouwen/mannen

- 1 pijn of branderig gevoel bij plassen
- 2 kleine beetjes plassen
- 3 pijn bij/na vrijen
- 4 pijn/steken onderbuik (locatie?)
- 5 blaasjes rond geslachtsdelen of anus
- 6 wratjes rond geslachtsdelen of anus
- 7 zweertjes rond geslachtsdelen of anus
- 8 keelklachten
- 9 koorts
- 10 ontstoken ogen
- 11 pijn bij de anus
- 12 ulcus

Vrouwen

- 13 jeuk, locatie: _____
- 14 veranderde afscheiding
- 15 veranderde menstruatie
- 16 contactbloedingen na of bij het vrijen
- 17 anders: _____

Mannen

- 18 afscheiding uit penis
- 19 pijn/steken bijballen
- 20 anders: _____

10. Behoort u tot een van de SOA-risicogroepen (zie onder)?

- Nee
- Ja, namelijk _____

En uw sekspartner?

- Nee
- Ja, namelijk _____

Risicogroepen zijn mannen die seks hebben met mannen (MSM); prostituees en prostituanten (contact in de afgelopen zes maanden); personen afkomstig uit een soa-endemisch gebied (eerste en tweede generatie)¹; personen met veel wisselende contacten (drie of meer in de afgelopen zes maanden); personen met een partner uit een van de voorgaande groepen.


11. Zijn er nog zaken die u zou willen toevoegen die niet gevraagd zijn?

Voor de assistente/huisarts

Welke testen moet u aanvragen?

Op basis van de door de patiënt aangegeven klachten (zie voorkant) en gebruikte sekstechnieken (zie vraag 5a) kunt u via onderstaande schema bepalen wat er getest moet worden. Bij dit schema gaan wij ervanuit dat uw patiënt onveilige seks heeft gehad. Bij veilige seks is een test aanvragen niet nodig. Kijkt u bij het antwoord op vraag 1 om te beoordelen of u de patiënt op consult laat komen of doorverwijst naar Sense.

Het is erg belangrijk dat u de juiste locatie (vagina, urethra, anus, rectum en/of keel) test! Een schema hiervoor kunt u vinden op de website van Izore (Vademecum / SOA-set).



Let op: bovenstaande onderzoeken dienen te worden aangevuld met specifieke diagnostische testen afhankelijk van de klachten:

Bij ulcus: denk aan Lues (syfilis);

Bij genitale blaasjes: testen op Herpes simplex (HSV);

Bij fluor: maak de afweging om de fluor te laten onderzoeken:

FLUOR C

- Fluor/vaginitis kweek: gisten, hemolytische streptokokken (m.u.v. GBS)
- Bacteriële vaginose PCR

Let op: Denk aan de partnerwaarschuwingen wanneer de testuitslag positief is.

N.B. Denk bij personen met urogenitale klachten die kunnen passen bij een SOA waarbij het onderzoek op Chlamydia en GO negatief uitvalt ⁴ en bij patiënten met persisterende klachten na behandeling van een Chlamydia of GO aan Mycoplasma genitalium.

SOA: Mycoplasma genitalium C

- ♂ urine 1e portie
- ♀ vagina

¹ Voor een actueel overzicht van soa-endemische gebieden zie NHG-standaard Het soa-consult (M82).
² Zie vraag 10.
³ Bij aanvragen voor SOA-diagnostiek uit verschillende materialen (urine, vagina-uitstrijk of bloed) per materiaal een Izore aanvraagformulier meegeven.
⁴ U kunt telefonisch een analyse toevoegen binnen 2 weken na afname materialen.